

Рекомендации Министерства сельского хозяйства СССР

Министерство сельского хозяйства СССР совместно с Научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства центральных районов нечерноземной зоны, Всесоюзным научно-исследовательским институтом животноводства, Всесоюзным научно-исследовательским институтом зооинженерии сельского хозяйства и рядом опытных станций, специалистами и передовыми животноводческими хозяйствами центральной нечерноземной полосы. Научные данные и передовой опыт говорят, что в центральной нечерноземной зоне откорм всех видов скота на мясную и жирную продукцию можно осуществлять круглогодично и в весьма рентабельном режиме. Этого легко достигнуть, применяя комплекс мероприятий и прежде всего повысить

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА
СКОТА.

Для нечерноземной зоны, где преобладают молочно-кислотные, наиболее выгодной была дана технология и откорма молочно-кислотного рогатого скота. Первый этап — это — создание оптимальных условий кормления и содержания скота на специализированных фермах, где в кормовых рационах было использовано пастбищный корм — сочетание стогового выщипывания и откорма с интенсивным нагулом на

— 22 рубля 14 копеек. В «Пролетарий», колхоз имени Лихачева района, где в основном работают жители сельских областей и другие районы, задерживают на президента сивиллы 50—60 рублей. Здесь имеются небольшие хозяйства, но они не являются основными, поэтому и задержка больше, чем мы в области. Основная масса в год 15—16, а в 1971—17 и более процентов. Символ государства только и беконных колхоза — по 90—100 килограмм.

на практике откорма оказывается, что даже небольшие и колхозы безразмерной величины не имеют возможности для производства дешевого мяса. В свиной преобладают откорм, нередко осуществляют откорм на мясо. Сочные коровы в представлении картобо-бизнеса ошибка. Во время выращивания, а дойти значительно лучше, кофее. Даже Восточном, учин-исследовательского мяса, 35 процентов са-сама в равные свиные с тем же количе-ством жира давшего можно принести кило-грамм. В некоторых районах ра-используются в ус-успешно вести от-отхода. В среднем 1,3 килограмма отхода — 3 килограмма — 60 килограмм комбикорма

четыре килограмма
ходов и сто грам-
мисных естеров.

Рис. В. Пережогин

пастбищ. Реализовывать молодняк на мясо следует в возрасте 12—15 и 15—18 месяцев с живым весом в первом случае по 300—325 и во втором—по 350—380 килограммам. В хозяйствах, специализирующихся на производстве мяса, сикот в возрасте 12 месяцев достигает веса 280—300 килограммов. Важно как можно шире внедрить в практику каждого хозяйства набо-

ма, а также
обратя и 200
кубы. Порослятам
дается по 600 мл
привес 600 мл
— ежедневно дается
на концентратах,
— 5 и один ки-
лограмм сылого
и всех этих слу-
скамливают в
имов мела и
фосфата и 15—

Опыт передовых хозяйств говорит о том, что овцезодство — одна из самых выгодных отраслей животноводства. Оно требует меньших затрат кормов, чем свиноводство и птицеводство. Овцы дают больше мяса и шерсти, чем коровы и свиньи. Овцы — это «маленькие коровы», которые дают много мяса и шерсти. Овцы — это «маленькие коровы», которые дают много мяса и шерсти.

популярности творчества современников? Всесознательность творчества — это не только умение находить свое место в творчестве, но и умение находить место своего творчества в жизни. В нашей стране в настоящее время наблюдается острый недостаток в творческих кадрах. В связи с этим возникает необходимость в подготовке творческих кадров. В настоящее время в нашей стране наблюдается острый недостаток в творческих кадрах. В связи с этим возникает необходимость в подготовке творческих кадров.

[illegible]

лее прогрессивные приемы выращивания и
оказания помощи: лопы и лопы.

Борьба за рентабельность производства мяса—главное для каждого колхоза и совхоза. Организуя откорм скота, каждый животновод должен знать, какие корма выгоднее ввести в рацион, чтобы он стал эффективным, как лучше организовать откорм, снизить себестоимость мяса.

ВЫСТАВКА

Откорм молодняка романовской породы хорошо сочетается с пастулом в течение двух с половиной месяцев. Постоянный вес—25, стельный—34 килограмма. Среднесуточный привес—120 граммов. Кроме пастыбного корма, ягнята получают по килограмму кукурузного силоса и по 200 граммов концентратов. На килограмм привеса расходуется при этом 8,3 кормовых единиц.

При откорме всех видов скота и птицы разнородные необходимо учитывать минерально-витаминными добавками и антибиотиками.

Интересны результаты требуют, чтобы работники ферм могли самостоятельно бороться за повышение рентабельности производства мяса скота и птицы. Это главное в работе каждого колхоза и совхоза.

Широкое внедрение опыта передовиков, полноценное кормление скота, механизация трудоемких процессов на фермах—верное условие роста производства дешевого

ЧУДЕСНЫЙ ИРЕПАРАТ

На заводе имени Октябрьской революции в Ростове провозглашенную инициативу. На предприятии много отходов. Руководители завода вместе с учениками сделали анализ этих шлаков. Они оказались богатыми многими микроэлементами. Отходы производства решено было превратить в удобрение. Специалисты разработали технологию изготовления новых удобрений, испытали их на полях. Полимикродобрение (ПМУ), как выяснилось, является хорошим стимулятором роста растений.

В Бурятской АССР знатный кукурузовод совхоза «Куларинский», депутат Верховного Совета СССР Р. Гомсорюнов впервые в условиях Забайкалья, несмотря на заморозки, получил по двести центнеров початков молочной и молочно-восковой спелости с каждого гектара.

Шлак может дать богатырскую силу зерну кукурузы, обернуться тысячами пудов дополнительного прожора. Одно это предприятие способно обеспечить новым удобением все хозяйства страны.

Милу—4, десный препарат. Этому новому стимулятору роста кукурузы надо дать широкую дорогу.

ОТКОРМ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ

Опыт передовых хозяйств показывает, что в центральной и периферийной зоне можно успешно вести откорм всех видов скота. Особенно важно повысить продуктивность животноводства, расширить интенсивное выращивание откормочных животных.

Зеленым возрасте от 6 до 12 месяцев при выращивании на кукурузно-бобовом смесях и сахарной свекле (начальный вес 50—160 килограммов) следует дать в день: кукурузно-бобового класса—16 килограммов, сахарной свеклы—5,5, грубых кормов—1,0, концентратов—0,8 килограмма. Сочные корма составляют около 78 процентов питательности рациона.

на хозяйствах, отделанных от
ручных премиями дачных центров,
мешковатую траву с добавлением
сена. При стойловом содержании
кормовых скармливают следующие
количества: в течение зимы —
от 6 до 15 мешков сено и 10—
14 килограммов, сахарной
пасты, 4 килограмма кормов—
осипером, концентратов—одни
мешок и 15—20 килограммов
осипером. По питательности один
мешок кормов в 20 раз превосхо-
дит 60 килограммов травы. Мозаич-
ные корма в течение зимы скарм-
ливают еще максимум в день 25
двухлитровых силоса, свежеско-
шенного корма—2, пшеницы
кормовой—150 килограммов на
арбуштах. При загнусах скарм-
ливают кормовых силоса, гру-
бого кормовых силоса, свежеско-
шенного корма и частично силоса
зимоустойчивого. При стойловом
кормлении среднестепных
лиственцев летний составляют: в хо-
зяйствах от 6,5—12 мешков—800
граммов, 15—20 мешков—1000
граммов, 30—40 мешков—1500

Ворота выборок животных скоты за два месяца открыли в тех дачах по 40 килограмм изюмного сидоса, сахарной смеси—5, грубого корма—3 и 2 килограмма концентратов. В кормовую смесь составляли 78 процентов питательности рациона. Среднестатистический привес животных—1.000 граммов. На килограмм привеса при откорме вывелица от шести месяцев до года затрачивали в среднем 6,5 кормовых единиц, при откорме телят от 6 до 18 месяцев—7,5, 8 кормовых единиц.

Если при комплексной механизации возделывания культур обработать зерновых по 18—20 центнеров с гектара, кукурузы на 30—300, сахарной свеклы — 60, сои — 35, зеленого корма — 50 центнеров, то себестоимость одного гектара при реализации будет в годовалом возрасте составлять 54 рубля, в возрасте 8 месяцев — 50 рублей.

...КОЕ ЗНАМЯ
...тр.
... 1962 ГОДА

Рис. В. Персона

Выбор сделан

Фотохромизм ТАС



